


PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢN ĐỀN

Số đến: 874.....

Cơ quan ban hành văn bản: Sở Y tế.....

Số ký hiệu văn bản: 1394/SYT - NV7..... Ngày tháng văn bản: 17/6/2016

Tham mưu ý kiến xử lý của Văn phòng	Duyệt Lãnh đạo	Bộ phận khoa/phòng xử lý văn bản
Ban Giám Đốc P. HC TC, PK HC TC Khoa KSCB TN	21/6/2016 	

Trong trường hợp không áp dụng các giải pháp trên, đề phòng bệnh viêm gan B

Số: 1331/SYT-NVY  
V/v tăng cường phòng bệnh VGB cho  
trẻ sơ sinh

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 6 năm 2016

Kính gửi:

T.T.Y TẾ DỰ PHÒNG TT.HUẾ  
CÔNG VĂN ĐẾN  
Số: 874  
Ngày: 21/6/2016

Bệnh viện Trung ương Huế;  
Bệnh viện Đại học Y Dược Huế;  
Bệnh viện Giao thông Vận tải Huế;  
BVĐK Tỉnh; BVĐK Chân Mây; BVĐK Bình Điền;  
Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, do thiếu hụt nguồn cung cấp vắc xin viêm gan B từ Trung ương nên dự kiến trong thời gian đến các cơ sở tiêm chủng sẽ thiếu hụt vắc xin viêm gan B để triển khai tiêm cho trẻ trong 24 giờ đầu sau khi sinh. Do đó sẽ không thể phòng ngừa được những trường hợp lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con cũng như những trường hợp trẻ bị nhiễm viêm gan B trong những tháng đầu đời do việc chăm sóc không đảm bảo.

Để tăng cường công tác phòng bệnh viêm gan B cho trẻ sơ sinh trong giai đoạn thiếu hụt vắc xin viêm gan B, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai các công việc sau:

- Tuyên truyền vận động đối tượng phụ nữ tuổi sinh đẻ tiêm vắc xin phòng bệnh viêm gan B (trong tiêm chủng dịch vụ) trước khi mang thai.

- Triển khai tiêm vắc xin dịch vụ viêm gan B cho trẻ trong 24 giờ đầu sau sinh ngay tại bệnh viện. Lưu ý khám sàng lọc cho trẻ và tư vấn cho bà mẹ về việc tiêm vắc xin dịch vụ cho trẻ.

Trong trường hợp không áp dụng các giải pháp trên, để phòng bệnh viêm gan B cho trẻ, cần phải tư vấn bà mẹ:

+ Xét nghiệm sàng lọc viêm gan B cho bà mẹ trước khi sinh. Đối với những trường hợp bà mẹ có xét nghiệm (+) với vi rút viêm gan B, cần tiêm globulin miễn dịch viêm gan B (HBIG) cho trẻ ngay sau khi sinh.

+ Cần đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh trong quá trình chăm sóc, tránh tình trạng lây nhiễm viêm gan B từ người chăm sóc sang cho trẻ.

+ Đem trẻ đến trạm y tế để được tiêm vắc xin Quinvaxem (phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và nhiễm khuẩn do Hib) khi trẻ đủ 2 tháng tuổi.

- Tiếp tục triển khai tiêm chủng cho trẻ trong 24 giờ đầu sau khi sinh ngay sau khi được cung ứng trở lại vắc xin viêm gan B.

Sở Y tế kính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- TTYTDP tỉnh;
- Lưu: VT, NVY.



GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Nam Hùng